



Moxalole™
Lettelse du kan stole på. Letopløseligt afføringsmiddel mod forstoppelse.




Er du træt og udkørt efter den lange, kolde vinter, så spørg på apoteket. Her tilbyder vi faglig rådgivning til hele familien om sunde vaner og et godt helbred.

Xerodent®
Effektiv hjælp ved tør mund. Fås med appelsin- eller lakrids-smag.



Vizcure®
Ekstra fugt og næring til tørre øjne. Kan anvendes af kontaktlinse-brugere.



Produktinformation: Moxalole™ Osmotisk virkende afføringsregulerende middel indeholdende macrogol 3350, natriumhydrogencarbonat, natriumchlorid og kaliumchlorid. **Virkning og anvendelse:** Behandling af kronisk forstoppelse. Opløsning af hård og indeklemt afføring (faecal impaction), som er konstateret af lægen. **Dosering:** Kronisk forstoppelse: Voksne: 1-3 breve dagligt i opdelte doser, afhængigt af individuelt respons. En behandling varer normalt ikke længere end 2 uger, men kan gentages om nødvendigt. Ved længerevarende brug kan dosis blive justeret til 1-2 breve dagligt. Børn: Bør ikke anvendes til børn under 12 år. Faecal impaction: Voksne: 8 breve dagligt indtaget over et tidsrum på 6 timer. Behandling varer normalt ikke længere end 3 dage. Børn: Bør ikke anvendes til børn under 12 år. **Anvendelsesmåde:** For anvendelse skal hvert brev indhold opløses i 125 ml vand. Ved behandling af faecal impaction kan 8 breve opløses i 1 liter vand. Patienter med nedsat hjerte/kredsløbs-funktion: Ved behandling af faecal impaction bør dosis fordeles således, at der ikke gives mere end 2 breve inden for en time. Patienter med nedsat nyrefunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig ved hverken kronisk forstoppelse eller faecal impaction. **Advarsler og forsigtighedsregler:** Må ikke anvendes ved overfølsomhed overfor nogle af ingredienserne. Bør ikke indtages dagligt over længere perioder med mindre det er aftalt med lægen. Langvarig brug kan føre til vanedannelse og svækkelse af tarmfunktionen. I tilfælde af man bliver svag, stakåndet, meget tørstig med hovedpine eller får opsvulmet anklér skal lægen kontaktes med det samme. Bør ikke anvendes uden samråd med en læge ved graviditet eller amning. **Bivirkninger:** Almindelige bivirkninger: Kvalme, mavepine, mavekrampe, maverumlen, luft i mave og tarme, diaré og opkastning. Allergiske reaktioner forekommer meget sjældent. **Tilskud:** Ikke tilskudsberettiget, men der kan søges om individuelt tilskud. **Pakningsstørrelser:** Moxalole 8 stk., 20 stk., 50 stk. og 100 stk. Læs indlægssedlen inden brug.